

Profesores & Escuelas

Las causas de la GLUCOSA DE SANGRE BAJA son
 Un cheque perdido o retrasado, no hay suficientes carbohidratos,
 Demasiada insulina, Comida perdida, Comida retrasada,
 Demasiado ejercicio o ejercicio no programado



CHECK
DON'T
GUESS



**Estos son signos y síntomas
 NO se ignorado y debe ser tratado**

NO siempre prevenible y el tratamiento es necesario lo antes posible!

Página 2

Suave	Moderado	Severa
Hambre, Mareos Irritable, Pallor Temblor, sudoración Débil, somnoliento Sudoroso, llorando Ansioso, Dolor de cabeza Incapaz de concentrarse Entumecimiento del labio y la lengua	Somnolencia Comportamiento errático Mala coordinación Confusión Discurso sordo	Incapaz de tragar Combativo Inconsciente Asimiento

Advertencia

**ESTOS SON SÍNTOMAS BÁSICOS Y PUEDEN IR DE
 DE LEVE A GRAVE EN CUESTION DE MINUTOS SI NO SE TRATA**

PRIMERA ACCION NECESARIA ES CHECK DON'T GUESS

**Notificar a la enfermera de la escuela: Compruebe el nivel de sangre/glucosa
 SIGUE el plan de gestión médica individualizado**

PERO TAMBIÉN: SI NO HAY MEDIDOR

En caso de duda por un bajo TREAT lo antes posible

**POR FAVOR, VEA LA SIGUIENTE PAGINA
 PARA LOS BÁSICOS SUGERIDOS
 TRATAMIENTO PARA la hipoglucemia -
 BAJO NIVEL DE GLUCOSA EN SANGRE**

Por favor, siga el plan médico del niño!.

PUEDA SUCEDER EN CUALQUIER MOMENTO Y EN CUALQUIER EDAD - ¡SOLO SUCEDE!

Diabetes the Parents Side International
 2013 - 2014

www.autoimmunediabetealliance.org

Hipoglucemia - BAJO NIVEL DE GLUCOSA

"CHECK DON'T GUESS"