

Profesores & Escuelas

PRIMERA ACCION NECESARIA: CHECK DON'T GUESS
 Notificar a la enfermera de la escuela: Compruebe el nivel de sangre/glucosa

SIGUE el plan de gestión médica individualizado
 Pero, siempre en duda TRATAR EL SYMPTOM!

CHECK
 DON'T
 GUESS



**Estos signos y síntomas
 NECESITA SER TRATADO INMEDIATAMENTE**

¡El tratamiento es necesario lo antes posible! Si es posible, siga el plan

Página 3

Suave

Hambre, Mareos
 Irritable, Pallor
 Temblor, sudoración
 Débil, somnoliento
 Sudoroso, llorando
 Ansioso, Dolor de cabeza
 Incapaz de concentrarse
 Entumecimiento del labio y la lengua

TRATAMIENTO SUAVE

- Proporcione la fuente de azúcar:
 2-4 comprimidos de glucosa o
 4 a 8 oz. Jugo o
 4 a 8 oz. Soda regular o
 Producto de gel de glucosa
- *No espere 10 minutos - Vuelva a comprobar
- *O Repita la fuente de azúcar si los síntomas persistir o la glucosa en sangre es inferior a 70
- *Proporcionar un refrigerio de carbohidratos & proteínas, es decir, galletas y queso
- *Comunícate con los padres

Moderado

Somnolencia
Comportamiento errático
Mala coordinación
Confusión
Discurso sordo

TRATAMIENTO MODERADO

- Igual que Arriba o ver a los estudiantes plan médico
- *Proporcione la fuente de glucosa:
 4 comprimidos de glucosa o
 15 gm gel de glucosa
- *Espere 10 minutos. Repita la glucosa si los síntomas persisten o la glucosa en sangre menos de 70
- *Sigue con un bocadillo de carbohidratos & proteínas, es decir, galletas y queso
- *Notificar a los padres

Severa

Incapaz de tragar
Combativo
Inconsciente
Asimienta

TRATAMIENTO SEVERO

- *Llame al 911
- *Dar Glucagón, si se ordena
- *Posición lateral
- *Contactar con los padres y la enfermera de la escuela

RECUERDE SIEMPRE VERIFICAR ANTES, DURANTE Y TRAS EL TRATAMIENTO

* Nunca envíe a un niño con sospecha de bajo nivel de azúcar en sangre solo

Diabetes the Parents Side International
 2013 - 2014

www.autoimmunediabetesalliance.org

"CHECK DON'T GUESS"

Hipoglucemia - BAJO NIVEL DE GLUCOSA